

ANEURISMA D'AORTA. UN REPTE A URGÈNCIES.

Sílvia Larrondo Pàmies; Anna Palau Vendrell; Osvaldo Troiano Ungerer; Ana Nieto Rodríguez;
Celia Polanco Martínez; Sílvia Flores Quesada
Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Urgències

INTRODUCCIÓ: L'aneurisma d'aorta és una patologia comú associada a l'envelliment, la hipertensió, l'arteriosclerosi... La majoria de persones no presenten símptomes fins que aquest augmenta de mida, es dissectiona o es trenca, esdevenint una patologia greu, amb pronòstic desfavorable i elevada mortalitat (85-90%) sinó s'orienta i es tracta adequadament. **OBJECTIU:** Revisar els casos d'aneurisma o dissecció d'aorta diagnosticats al nostre centre i fer una relació de l'epidemiologia, dels símptomes i signes que van motivar la consulta, les troballes en l'exploració física, el temps transcorregut fins al diagnòstic i la mortalitat. **METODOLOGIA:** Estudi retrospectiu i descriptiu on es revisen els 48 casos diagnosticats al nostre centre en pacients entre 15 i 100 anys d'edat durant un període de 10 anys (2004-2013). **RESULTATS:** Durant el període de revisió de l'estudi es van diagnosticar 48 casos, 81% homes i 19% dones, amb una edat mitjana de 70,6 anys. 29.2% es va tractar de disseccions d'aorta toràcica i 70.8% d'aneurismes d'aorta abdominal (38.2% íntegres i 61.8% trencats). 70.8% es van diagnosticar a urgències i 66.7% en menys de 6 hores (mitjana 2.16h). En l'exploració física destacava una TA mitja de 119/72mmHg i una FC mitja de 80bpm. 35.5% presentaven una massa abdominal palpable, 10.4% isquèmia d'extremitats inferiors, 7.4% absència de polsos radials, 32.5% absència de polsos pedis i 29.2% xoc. Els símptomes que van presentar els pacients van ser vegetatisme (47.9%), dolor abdominal (47.9%), dolor lumbar (41.7%), dolor toràcic (25%), clínica neurològica (16.7%), síncope (16.7%), dolor dorsal (10.4%) i altres (45.8%). La mortalitat va ser del 50%. **CONCLUSIÓ:** La presentació dels símptomes d'un aneurisma complicat pot ser molt variable i confosa, per això és important tenir-ho present per l'elevada mortalitat que implica. Donat que l'àrea d'urgències és el principal lloc de diagnòstic, justifica una bona orientació diagnòstica precoç.