



XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari



METÀSTASIS CUTÀNIES COM PRIMERA MANIFESTACIÓ DE CARCINOMA BRONCOGÈNIC. DIAGNÒSTIC MITJANÇANT PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA AL SERVEI D'URGÈNCIES

Victorio Belda; Jordi Bigas; Hector Pelaez; Francesc Casarramona; Josep Maria Alonso; Manel Daza

Servei d'urgències Hospital de Mataró

INTRODUCCIÓ

Les metàstasis cutànies són una manifestació poc freqüent de neoplàsies internes. Solen indicar un estadi tumoral avançat. Apareixent com a primera manifestació de la neoplàsia en el 0.8% dels casos.

Presentem dos casos de consulta per nòduls subcutanis dolorosos, en que es va practicar una Punció Aspiració amb Agulla Fina (PAAF) i Rx. de tòrax, essent diagnosticats de neoplàsia pulmonar amb metàstasis cutànies.

Material i mètodes

CAS 1: Pacient de 55 anys fumador de 84 paquets/any. Consultà per tumoracions al tòrax de 4 mesos d'evolució, doloroses, i pèrdua de 8 Kg.

Destacava la presència de lesions cutànies i hepatomegàlia.

PAAF d'un nòdul. citologia positiva per carcinoma de cèl·lula petita.

Rx tòrax: imatge nodular parahiliar esquerra, TAC tòrac-abdominal: lesió a língula suggestiva de T.Primari Pulmonar, múltiples adenopaties a tòrax i abdomen.

CAS 2: Pacient de 74 anys, ex-fumador. Consultà per tumoració submamària dreta dolorosa de 15 dies d'evolució.

Destacaven lesions indurades a tòrax i parietal-esquerra.

PAAF de tumoració, citologia positiva per adenocarcinoma suggestiva d'origen pulmonar.

Rx tòrax: imatge parahiliar dreta amb pèrdua de volum. TAC tòrac-abdominal: augment heterogeni de parts toves hiliars i parahiliars, suggestiva de N.Pulmonar, lesions suggestives de metàstasis òssies.

CONCLUSIONS

- La forma més freqüent de presentació de les metàstasis cutànies són els nòduls de consistència pètria. Ocasionalment presenten aspecte abscesiforme que pot portar a practicar un intent de drenatge a la primera visita a Urgències.
- El diagnòstic de les metàstasis cutànies es realitza per clínica i histologia. En els casos presentats el primer diagnòstic es realitzà mitjançant PAAF de la tumoració cutània.
- Volem destacar el mètode diagnòstic de la PAAF al Servei d'Urgències, un mètode senzill, ràpid, amb escasses complicacions i amb una orientació molt fiable sobre l'origen de la neoplàsia primària.