



XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari



INFECCIÓ PER CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN POBLACIÓ SENSE FACTORS DE RISC

Ana Condón Abanto; Rut Gaya Tur; Luisa Mateo Gallego; Marta Berned Sabater; Carme Boqué Oliva; Graciano García Pardo

Servei d'urgències; Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducció: Clostridium difficile és un bacil gram positiu formador d'espores, anaerobi estricte. Aquest bacteri es troba a la microbiota intestinal normal en un petit nombre d'individus sans i de pacients hospitalitzats. En els últims anys, s'ha detectat un augment d'incidència d'aquesta infecció, resultant cridaner que, depengui en part, dels nous casos registrats d'infecció adquirida a la comunitat i que sigui emergent en animals.

Objetiu: Descriure la incidència de Clostridium difficile, així com les característiques sociodemogràfiques i clíniques d'aquest quadre.

Metodologia: Anàlisi retrospectiva dels resultats dels estudis de detecció de la toxina de Clostridium difficile, realitzats a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, en un període que comprèn des de l'1 de gener de 2014, fins a l'1 d'agost de 2014.

Resultats: Durant el període descrit, es van aïllar un total de 27 casos de infecció per Clostridium difficile. El 63% eren homes amb una edat mitjana de 77,6 anys. 7 (28%) dels casos aïllats la infecció, va ser adquirida a la comunitat (5 d'ells sense factors de risc associats), 6 (24%) de la infecció va ser relacionada amb l'activitat mèdica. I dels 12 (48%) restants van ser pacients ingressats, amb edat mitjana molt superior respecte a la resta dels grups i objectivant que el 83,3% dels pacients sofrien malalties concomitants, immunosupressió i/o factors de risc associats. **Conclusió / Discussió:** Revisant la bibliografia, destaca que mentre en els casos de infecció nosocomial o en relació amb l'assistència sanitària es coneix tant la patogenia com els factors de risc, poc es coneix dels casos de infecció adquirida a la comunitat. Per aquest motiu i donades les característiques dels casos descrits, molts autors i investigadors han estimat que la transmissió alimentària podria ser una de les causes.