XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari

¿ES ÚTIL LA DETERMINACIÓN DE TÓXICOS EN ORINA EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN UCIAS POR INTOXICACIÓN POR BZD?

Indra Sanoja; Ruben Carrasquer; Gemma Agudo; Marta Puigcercós; Isabel De Valles; Jessica Rey

Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona)

INTRODUCCIÓN: La mayoría de las intoxicaciones atendidas en UCIAS de nuestro Hospital es medicamentosa y los fármacos más implicados son las Benzodiacepinas (BZD).
OBJETIVO: Analizar la repercusión que tiene la solicitud de drogas en orina en las intoxicaciones por BZD en relación al diagnóstico, tratamiento del paciente y repercusión económica.
MÉTODOS: Análisis de las solicitudes de orina en pacientes que acudieron a UCIAS por intoxicación por BZD en el intervalo de enero- diciembre del 2013
RESULTADOS: En el 2013 se atendieron en nuestro Hospital 635 intoxicaciones, de las cuales el 38% (243) han sido por medicamentos (solos o combinados con otras sustancias) y de éstos el 64% (156) han sido BZD. En 52 de estas intoxicaciones (33%) se solicitó test de drogas en orina a pesar de que el 61% de los pacientes recibían tratamiento habitual con BZD. En el 100% se detectó BZD positivas en orina pero también se detectaron 5 positivos a cannabis, 6 positivos a cocaina, 5 positivos a ATD, 1 positivo a anfetas, 1 positivo a metamfetas y 1 positivo a metadona. Todos los resultados repercutieron en el diagnóstico final sin verificación de los mismos.
En el 42% se administró flumazenil y en un 17% no se realizó ningún tratamiento. Los test realizaron supusieron un gasto de 2996,7 euros.
CONCLUSIONES: La determinación de tóxicos en orina no influye en el tratamiento ni evolución de estos pacientes, además de suponer una repercusión económica. Hacer constar en una historia clínica un diagnóstico de consumo de substancias basado en estos test puede suponer un problema, tanto científico como legal.