



XXIII^e

Congrés nacional català d'urgències i emergències

PUNT D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

Seu: Tecnocampus
Mataró 14 i 15 d'abril 2016

CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

Germans Trias i Pujol
Hospital

SoCUMUE

TecnoCampus
Mataró-Maresme

CANVIS EN LES CARACTERÍSTIQUES DE LES INTOXICACIONS EN PACIENTS NASCUTS FORA D'ESPANYA.

August Supervía, Oriol Pallàs, Mònica Marín¹, Francisco del Baño, Isabel Puente, Carlos Clemente.

Servei d'Urgències. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducció: Les intoxicacions em malats nascuts fora d'Espanya son freqüents. Es probable que les característiques canviïn en el temps.

Objectiu: Determinar les diferències en les característiques de les intoxicacions en pacients nascuts fora d'Espanya en dos períodes de temps.

Metodologia: Estudi retrospectiu de les intoxicacions ateses a un servei d'Urgències hospitalari en pacients nascuts fora d'Espanya des de Gener de 2009 fins Juny de 2014. Dades recollides: filiació, intencionalitat, lloc i tipus d'intoxicació, forma d'arribada, destinació final i dades clíniques. Es van comparar les característiques de les intoxicacions entre els períodes 2009-11 i 2012-14.

Resultats: Es van recollir 3693 visites per intoxicacions agudes, 1389 (37,6%) en pacients nascuts fora d'Espanya (37,1% en el primer període i 38,2% en el segon). La comparació entre períodes va mostrar una disminució en el percentatge d'homes (66,8%vs60,7%; $p=0.018$). La iniciativa per mitjans propis (21,8%vs26,1%) i derivats des d'un CAP (0vs3,8%) va augmentar, disminuint els traslladats pel SEM (72,7%vs64,1%) ($p<0.001$). La intencionalitat suïcida va disminuir (15% vs 11%) i la recreativa va augmentar (74,7%vs78,2%) ($p=0.035$). Hi havia més pacients amb antecedents psiquiàtrics (23,7%vs36,4%; $p<0.001$), i van augmentar les intoxicacions enòliques (70,9%vs75,7%; $p=0.047$) i per drogues d'abús (28%vs34,8%; $p=0.006$), entre les que destaquen les intoxicacions per MDMA ($p=0.001$) i amfetamines ($p<0.001$). El percentatge d'intoxicacions per fàrmacs roman estable, si be s'observa un augment en les intoxicacions per antidepressius ($p=0.001$). Hi ha més malats que precisen tractament (41,4%vs49,2%; $p=0.05$) i contenció mecànica (9,3%vs15%; $p=0.003$), sense existir canvis significatius en l'ús d'antídots i de carbó actiu. L'emissió de comunicats judicials és baixa en els dos períodes (28%vs29,9%).

Conclusions: En el segon període s'observa una disminució d'homes, havent augmentat les intoxicacions recreatives, sobre tot per MDMA i amfetamines. Han augmentat els pacients amb agitació que requereixen contenció mecànica. L'emissió de comunicats judicials és baixa.