



INTERVENCIONS FARMACÈUTIQUES REALITZADES EN UN SERVEI DE CURTA ESTADA D'URGÈNCIES

Florit, Marta¹; Borràs, Laura¹; García, Milagros¹; Epelde, Francisco²; Gorgas, M Queral¹
¹Servei de Farmàcia; ²Servei d'Urgències. Hospital Universitari Parc Taulí

Introducció

L'ús de fàrmacs pot comportar l'aparició de problemes relacionats amb la medicació (PRM).

Una de les responsabilitats del farmacèutic d'hospital és el seguiment farmacoterapèutic dels pacients.

Objectiu

Descriure les intervencions farmacèutiques (IF) realitzades a la unitat Curta Estada d'Urgències (CEU) per prevenir PRM i la seva acceptació per part de l'equip mèdic. Analitzar les IF segons el tipus de pacient: Pacient Crònic Complex (PCC), Malaltia Avançada Crònica Aguditzada (MACA), no PPC/MACA.

Metodologia

Estudi retrospectiu observacional descriptiu durant 6 mesos (gener-agost 2016) dels pacients ingressats a la CEU (20 llits; període d'estada 2.55 dies).

Les IF realitzades pel farmacèutic de dilluns a divendres van ser comunicades al metge responsable i registrades.

Variables: tipus de pacient, tipus d'IF i la seva acceptació per part de l'equip mèdic.

Resultats

344 IF registrades en 248 pacients: 14 IF en 8 MACA, 95 en 66 PCC i 235 en 174 pacients no PCC/MACA.

Acceptació IF: 79.9% acceptades, 6.7% no acceptades i 13.4% no resoltes abans de l'alta del pacient.

IF més freqüents: 36.6% detecció d'omissió de medicació crònica (65.9% acceptades, 7.9% no acceptades, 26.2% no resoltes), 21.1% equivalent terapèutic (98.6% acceptades, 1.4% no acceptades), 16.3% monitoratge (96.4% acceptades, 3.6% no acceptades), 7.3% ajust de posologia (72% acceptades, 16% no acceptades, 12% no resoltes).

IF més freqüents en MACA: 35.7% equivalent terapèutic, 28.6% detecció d'omissió de medicació crònica. En PCC: 47.4% detecció d'omissió de medicació crònica, 14.7% monitoratge, 7.4% ajust en insuficiència renal i 7.4% equivalent terapèutic. En pacients no PCC/MACA: 32.8% detecció d'omissió de medicació crònica, 24.3% equivalent terapèutic i 17.4% monitoratge

Conclusions

La IF més freqüent va ser la detecció d'omissió de medicació crònica.

Es va obtenir una elevada acceptació de les IF per part de l'equip mèdic.

Les IF realitzades pel farmacèutic a la CEU són importants en la prevenció de PRMs.