



ADEQUACIÓ DE L'ÚS DE CATÈTERS VENOSOS PERIFÈRICS EN ELS PACIENTS NIVELL IV-V DEL SERVEI D'URGÈNCIES

Gerard Mora López; Blanca Escatllar González; Xavier Teixidó Huertas; Jessica Capera Fernandez; Silvia Uruen Pueyo; Carme Boqué Oliva
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Introducció

La inserció dels catèters venosos perifèrics (CVP) constitueixen una de les tècniques més realitzades al servei d'urgències hospitalari. Els criteris d'adequació extrets de la revisió bibliogràfica inclouen a aquells pacients que necessiten tractament endovenós o reposició de volèmia, als que hagin d'ingressar a l'hospital i als que se'ls realitzi més de dues extraccions seriades mentre estan al servei d'urgències.

Objectius

Avaluar la taxa d'adequació de l'ús de catèters venosos perifèrics en els pacients nivell IV-V del servei d'urgències d'un hospital universitari

Proposar accions de millora per garantir l'adequació de l'ús de CVP en pacients nivell IV-V.

Metodologia

Estudi descriptiu transversal retrospectiu en el que es considera població objecte d'estudi a tots els pacients amb nivell de triatge IV-V atesos al servei d'urgències de l'hospital participant en l'estudi durant els mesos de novembre i desembre de 2015, que se'ls hi hagi inserit un CVP. Criteris d'exclusió: pacients pediàtrics, amb un nivell III o superior, traumàtics o ginecològics. Per a la recollida de dades es va realitzar un qüestionari ad hoc, on s'analitzen variables demogràfiques i relacionades amb la patologia i l'adequació del CVP. L'estudi compta amb l'autorització de la direcció del centre.

Resultats

Dels 1875 pacients atesos amb nivell IV-V. Es van inserir total de 162 CVP. La mostra presenta una mitja d'edat de 45,29 anys, 54,7% dones i 43,5 homes, un temps d'estada mitjà al servei de 4 hores. Es realitza una primera analítica al 84,5% dels casos i s'administra analgèsia endovenosa al 65,5 dels casos. El 88,7% dels pacients son altats. Un 38,5% dels CVP que no estarien adequats.

Conclusions

Existeix una alta inadequació de l'ús de CVP en pacients nivells IV-V i per tant cal implementar mesures de millora com ara l'elaboració d'una guia de bon ús del CVP i accions informatives als professionals per millorar l'adequació.