



EL TCE I EL CONSUM D'ALCOHOL

Oriol Yuguero Torres; Maria José Abadías Medrano; Xavier Ichart Tomàs; Marianela Guzman; Maite Castañ Abad; Alba Marí Lopez
Servei Urgències

Introducció:

El Traumatisme Craneo-Encefàlic(TCE) és un motiu de consulta freqüent als serveis d'Urgències Hospitalaris. El consum d'alcohol pot ser un dels factors desencadenants, i en molt casos pot provocar una patologia endocranial greu. Les hemorràgies cerebrals relacionades amb alcoholisme poden predisposar a un augment d'aquesta patologia. En moltes ocasions la realització de proves complementàries requereix mesures de contenció tant farmacològica com mecànica

Objectiu:

Revisar els casos de TCE que s'han produït en el context de consum d'alcohol entre el Gener i Juny de 2016 a un Servei d'Urgències Territorial

Metodologia:

Estudi descriptiu transversal dels 13 casos que s'han registrat. Es farà una descripció de variables sociodemogràfiques i de relació amb el TCE.

Resultats:

La majoria dels TCE en el context d'alcoholisme es realitzen a la via pública (84,6%). Un 30% dels casos va anar associat a pèrdua de coneixement. En un 77% dels casos es va realitzar TAC cranial i només es va detectar patologia intracraneal en 2 dels casos. El promig d'hores d'observació van ser 13 hores. En cap cas es va produir una mort a les 24, ni a les 48h.

Conclusions:

Tot i la predisposició al sagnat intracraneal en els pacients alcohòlics, en el nostre cas només en un 15% dels casos hi ha patologia després del TCE. La gran majoria de pacients sense patologia en les proves d'imatge ens recomana fer una reflexió sobre la idoneïtat de la contenció i la realització d'aquesta prova.