



VALORACIÓ CONJUNTA DELS PACIENTS ONCOLÒGICS A URGÈNCIES

Laia Llobera Rius; Carlos Erasun Lecuona; Carolina Tudela Cuadros; Neus Robert Boter; Anna Masferrer Martí; Joaquim Julià Torras
Institut Català d'Oncologia Badalona.

Els pacients afectes d'una neoplàsia sòlida són usuaris freqüents dels Serveis d'Urgències. La col·laboració per un facultatiu expert en aquesta patologia pot dinamitzar-ne el seu maneig. En el nostre centre s'implanta al març de 2016 la valoració conjunta d'aquests pacients amb un metge internista de la Unitat d'Hospitalització Oncològica (UHO).

OBJECTIU:

Anàlisi descriptiva dels pacients oncològics valorats a Urgències per la UHO.

METODOLOGIA:

Població d'estudi: Pacients amb neoplàsia que consulten a Urgències i són valorats per la UHO durant horari laboral (matí). Període estudi: Març 2016- Desembre 2016. Recollida de dades clíniques, motiu de consulta, de la valoració i resultat final.

RESULTATS:

S'han valorat 500 pacients, 67% homes, edat mitjana de 65 anys. La neoplàsia de pulmó ha estat la més freqüent (32%). Un 75% eren metastàtics. Un 58,6% rebien tractament antitumoral pal·liatiu, un 12,8% amb intenció radical i un 17,8% no en rebien.

El motiu de consulta més freqüent han estat les infeccions (30,8%). En un 61,8% la consulta a Urgències està relacionada amb la neoplàsia (19,6% complicacions del tractament, 13% dolor oncològic i 9% mal control d'altres símptomes).

La demanda de valoració en un 65,4% ha estat presa de decisions, un 15,6% seguiment i un 13,4% ajustar tractament.

Finalment, un 42,8% dels pacients poden ser donats d'alta des d'Urgències, un 48% són d'ingrés a la UHO, un 5,2% ingressen a un altre servei hospitalari.

CONCLUSIONS:

- El motiu de consulta del pacient oncològic a urgències acostuma a estar relacionat amb la seva neoplàsia i complicacions del tractament.
- Les infeccions són la patologia més prevalent.
- La col·laboració a Urgències d'un facultatiu expert en el maneig del pacient oncològic reforça la presa de decisions, permetent que gairebé la meitat dels pacients puguin ser donats d'alta des d'urgències i evitar ingressos innecessaris.