



## TRACTAMENT DEL DOLOR EN L'ASSISTÈNCIA PREHOSPITALÀRIA A PARTIR D'UNA BASE DE DADES DE 10 ANYS DE SEGUIMENT

M. Mar Sala; Joan Casadevall; Josep A. Mora; Àngel Olucha; Anna Portabella; Montse Soler  
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

### Introducció:

El dolor és un dels principals símptomes que atensem els serveis d'urgències i emergències prehospitalàries però tenim poques dades sobre la seva epidemiologia. És per això que, aprofitant una base de dades que registrem des de 2006, hem volgut veure'n l'epidemiologia bàsica per valorar com tractem el dolor i possibles escenaris de millora.

### Objectiu:

Determinar les característiques dels pacients amb dolor atesos per un servei d'emergències prehospitalàries.

### Metodologia

Anàlisi retrospectiu d'una base de dades registrada entre els anys 2006 i 2016. Les variables avaluades van ser: gènere, grup d'edat, etiologia i els fàrmacs utilitzats.

### Resultats

Dels més de 13000 pacients atesos pel SEM entre els anys 2006 i 2016, un 20% va rebre tractament pel dolor.

El 65% van ser homes i l'edat mitjana va ser de 60 anys ( $\pm 20$ ).

El principal tractament analgèsic utilitzat van ser els mòrfics (97%) que en un 27% es va combinar amb altres procediments (sedació, drenatges, cardioversió, IOT...).

El principal motiu de consulta per dolor va ser l'etiologia cardíaca (65%), i es van utilitzar mòrfics en un 13%. Pel què fa a l'etiologia traumàtica l'ús de mòrfics va arribar fins al 42%.

### Conclusions:

El dolor és un dels principals símptomes tractats en el medi extrahospitalari i és tractat de forma eficaç.

Els principals motius de dolor que es tracten són els coronaris i traumàtics, sent els opiacis el tractament més utilitzat, CI. Mòrfic en el cas dels coronaris i Fentanest en el cas dels traumàtics, com ja és conegut.

Si comparem resultats obtinguts en 10 anys i resultats obtinguts en treballs en períodes molt més curts, 1 any per exemple, els resultats són molt similars.