



XXV Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències

**La força
de l'equip**

19 i 20 d'abril de 2018
Palau de Congressos

Girona



Hospital Universitari de Girona
Centre d'Atenció Traumàtica

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

ANÀLISI COMPARATIVA DE LES FORMES GREUS DE GRIP ENTRE LES TEMPORADES 2016-2017 i 2017-2018

Guillem Guix; Gemma Lladós; Irma Casas; Cristina Prat; Guillermo Mena; Josep M. Mòdol.
Hospital Germans Tries i Pujol.

INTRODUCCIÓ

La grip és una malaltia vírica epidèmica estacional amb un important impacte pel que fa a la morbi-mortalitat. La simptomatologia i la gravetat del quadre clínic varien en funció de múltiples factors.

OBJECTIU

L'objectiu de l'estudi és comparar els factors de risc, la presentació i l'evolució de les gripes greus entre les temporades 2016-2017 (T1) i 2017-2018 (T2).

METODOLOGIA

Estudi observacional prospectiu dut a terme en un centre hospitalari en el que s'inclouen els casos diagnosticats de grip entre l'01.12.2017 i l'01.02.2018. Es comparen els casos greus, definits per l'existència de pneumònia, síndrome de distrès respiratori de l'adult (SDRA), fallida multiorgànica (FMO), ingrés en unitat de crítics (UCI) o èxits de la temporada actual, amb els de la temporada prèvia.

RESULTATS

A la T2 ja s'han diagnosticat un 70,6% més casos de grip que a la T1 malgrat encara no està finalitzada (464 vs 272), major percentatge de grip B (68,1% vs 1,5%, $p < 0,001$) però menys percentatge de casos greus (19% vs 33,1%, $p < 0,001$). No s'observen diferències entre T2 i T1 en el percentatge d'ingrés a UCI (3,9% vs 3,3%, $p = 0,34$) ni en la mortalitat (3% vs 1,8%, $p = 0,33$). Tampoc en l'edat, sexe, patologia de base ni percentatge de vacunats.

CONCLUSIONS

- A la temporada actual s'ha incrementat notablement el nombre de gripes diagnosticades, sense haver-se modificat el criteri per a la pràctica de proves diagnòstiques, probablement en relació a una escassa eficàcia de la vacuna.
- En contrast amb la temporada anterior, s'observa un increment notable del tipus B.
- La presentació clínica i la gravetat són similars entre ambdues temporades.