



XXV Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències

**La força
de l'equip**

19 i 20 d'abril de 2018
Palau de Congressos

Girona



Hospital Universitari de Girona
Centre d'Atenció Tècnica

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

FIBRIL·LACIÓ AURICULAR, MANEIG A URGÈNCIES SEGONS L'EDAT. ESTUDI DE COHORTS MULTICÈNTRIC URGFAICS

María Arranz Betegón; Ángel Sierra Moreno; Julia Santos Gala, Loreto Espuis Albás, Cristina Herranz Martínez, Javier del Castillo Nos.
Hospital de Viladecans.

Introducció: la fibril·lació auricular (FA) és l'arítmia més prevalent en els serveis d'urgències hospitalaris (SUH). Existeixen escassos registres en el nostre país que analitzin el maneig a urgències en funció de l'edat.

Objectiu: analitzar si hi ha diferències en el maneig a urgències dels pacients que consulten per FA en els SUH en funció de l'edat, segons tinguin <75 o ≥ 75 anys.

Mètode: estudi de cohorts ambispectiu i recollida consecutiva de tots els episodis de FA que motiven una visita al SUH, entre juliol i desembre de 2016, en cinc hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS). Es realitza anàlisi univariant i bivariant de les característiques basals en funció de l'edat.

Resultats: s'analitzen un total de 1.119 episodis de FA, el 48,4% amb <75 anys. Hi ha diferències en les característiques basals pròpies de l'edat, amb més presència de comorbilitats en els ≥ 75 anys. Aquest grup presenta més dispnea i malestar general i menys palpitations com a manifestació clínica. Es fa més el control de freqüència cardíaca i s'utilitza més la digoxina. Destaca que es valora menys el risc tromboembòlic i s'utilitzen més els anticoagulants antivitamina K.

Conclusions: Hi han diferències en el maneig de la FA a urgències en funció de l'edat, marcades sobretot perquè es fa més control de la freqüència cardíaca. Hi ha un infraregistre del risc trombòtic i hemorràgic, especialment en el grup ≥ 75 anys.