



XXV Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències

**La força
de l'equip**

19 i 20 d'abril de 2018
Palau de Congressos

Girona



Hospital Universitari de Girona
Centre d'Atenció Traumàtica

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CONCORDANÇA DIAGNÒSTICA DE LES DERIVACIONS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A URGÈNCIES DE TRAUMATOLOGIA

Luis Martinez-Sañudo; Xavier Oncins; Alfons Gasset; Enric Campderrich; Mariano Balaguer;
Pere Torner.
Hospital Universitari Parc Tauli Sabadell.

Estudi observacional de la concordança diagnòstica en pacients derivats d'atenció primària a urgències de Traumatologia. L'objectiu és conèixer la concordança en el diagnòstic d'aquests pacients. Es pretén amb aquest estudi descriure les característiques de les derivacions d'atenció primària urgències de traumatologia, així com la correlació entre l'orientació diagnòstica ambulatoria i el diagnòstic final hospitalari.

L'estudi ha estat observacional, revisant les histories mèdiques de 200 pacients que s'han visitat durant el període comprès entre gener de 2017 i el mes de gener 2018.

Hem revisat variables sociodemogràfiques (edat, gènere, dia de la setmana, temps d'arribada), variables de les derivacions (anamnesi, exploració i orientació diagnòstica) i el temps de l'estada en el servei d'urgències.

La concordança diagnòstica global ha estat del 35%, l'edat mitjana de 55 anys, El 50% eren homes. Pel que fa a les ferides, l'exploració ha estat present només en un 17% de derivacions. L'orientació diagnòstica ha estat present en el 70% de les derivacions. El diagnòstic de derivació més freqüent ha estat "Lesió Superficial de regions inespecífiques del cos"

Tenint en compte els resultats de l'estudi, es pot concloure que, l'atenció ambulatoria dels pacients que son derivats a l'Hospital és, en molts casos insatisfactòria. Bé perquè son derivats a l'Hospital sense orientació diagnòstica o be perquè aquesta no és l'adequada.

És detecta pel metge d'atenció primària un excés diagnòstic de malalties per "Lesió Superficial de regions inespecífiques del cos" i una sensibilitat molt baixa en patologies com: "contusió" o "esquinç".

Cal insistir en la formació en Traumatologia dels metges d'atenció primària, en una adequada derivació des dels centres d'atenció primària i en potenciar un bon model d'interconsulta amb l'especialista.