

Taller 3

ADEQUACIÓ I APROPIACIÓ DEL TRACTAMENT ANTIBIÒTIC EMPÍRIC A URGÈNCIES

1. Justificació:

L'administració precoç dels antibiòtics i l'elecció del tractament empíric basada en guies consensuades als Serveis d'Urgències Hospitalaris millora la morbiditat i la mortalitat i disminueix la duració de l'estada en pacients amb sèpsia greu i xoc sèptic. Els beneficis per a pacients amb sèpsia no greu són actualment objecte d'estudi, però ja existeixen dades concloents sobre infeccions meningies i pneumònia. La formació específica del personal mèdic d'Urgències pot influir sobre la precocitat en l'administració de la primera dosi, amb dosificació i intervals adequats durant les primeres 24 hores per fàrmacs de semivida curta, a més d'assegurar l'ajust de la dosi segons la funció renal; tot això té una influència directa sobre la morbimortalitat (pensar per exemple en les reaccions adverses farmacològiques), les estades hospitalàries, les despeses sanitàries i també la sobrecàrrega de treball per al personal sanitari.

2. Objectiu:

Actualitzar els coneixements sobre les indicacions del tractament antibiòtic precoç a Urgències i les guies per l'elecció del antibiòtic empíric segons el tipus d'infecció.

3. Objectius específics:

- 1- actuació general i maneig en la sèpsia greu
- 2- precocitat en l'administració del tractament antibiòtic
- 3- adequació del tractament antibiòtic segons focus
- 4- valoració de comorbiditats i multiresistències