



REVISIÓ DE LES PERICARDITIS DELS DARRERS 10 ANYS D'UNA UNITAT DE DOLOR TORÀCIC DEL SERVEI D'URGÈNCIES D'UN HOSPITAL DE TERCER NIVELL

Gemma Martínez-Nadal, Gemma Martínez-Nadal; Joan Padrosa; Óscar Miró, Pedro Cepas,
Jose Ramón Alonso, Beatriz López

Hospital Clínic de Barcelona

Introducció: Les pericarditis representen el 5% de les consultes als Serveis d'Urgències (SU) per dolor toràcic (DT). El seu diagnòstic es basa en criteris clínics, electrocardiogràfics i ecogràfics; la miopericarditis s'acompanya d'elevació de troponines.

Objectiu: Descriure les característiques clíniques, electrocardiogràfiques i ecogràfiques de les pericarditis a urgències.

Metodologia: Revisió retrospectiva de tots els episodis de consultes al SU per DT diagnosticats de pericarditis, documentats prospectivament en un hospital universitari (2008-2018).

Resultats: Es documentaren 983 episodis (2,6% de consultes per DT), un 33,6% eren dones. El 60% referien DT opressiu, el 71% canvis amb la respiració, en un 22% s'acompanyava de dispnea i en <1% de síncope. El 91% s'orientaren com un DT-no-coronari. Un 7,3% presentaren criteris de miopericarditis; en aquests eren més freqüents les alteracions electrocardiogràfiques (58% vs 23%; $p < 0,001$) i l'elevació difusa del ST (37% vs 16,5%; $p < 0,001$). En un 14% dels pacients amb elevació del segment ST de l'electrocardiograma (ECG) es realitzà un cateterisme urgent (cap objectivà lesions coronàries). En el 83% de les miopericarditis es realitzà una ecografia dirigida al SU: 55% normal, 35% vessament pericàrdic (9% dels quals amb clínica de taponament cardíac), 15% alteracions en la contractilitat, i 5% ambdues alteracions alhora. El 92% varen ser alta del SU, essent més freqüent l'ingrés en les miopericarditis (33% vs 6%; $p < 0,001$). Tots els ingressos a la Unitat Coronària tenien disfunció ventricular o taponament; el 95% de les altes tenien una ecografia normal o vessament pericàrdic lleu-moderat. Al 94% de les miopericarditis s'indicaren Antiinflamatoris no esteroideus (AINEs), l'ús de colquicina augmentà a partir de l'any 2016 (4% vs 54,5%; $p < 0,001$).

Conclusions: La majoria dels pacients amb pericarditis són donats l'alta des del SU amb indicació d'AINEs. Les miopericarditis s'associen més freqüentment a una elevació del ST en l'ECG. L'ecografia dirigida és útil pel maneig dels pacients amb miopericarditis.