



AMNÈSIA GLOBAL TRANSITÒRIA I CONSUM DE TÒXICS QUE MOTIVEN LA CONSULTA AL SERVEI D'URGÈNCIES

Concepción Moll Tudurí, Concepción Moll Tudurí^{1?3}; Daniel Santana Moreno²; Rosa Escoda Turón¹; Emilio Salgado Garcia^{1?3}; Ona Escoda Turón^{1?3}; Santiago Nogué Xarau^{1?3}.

1. Servei d' Urgències. Hospital Clínic de Barcelona. 2. Servei de Neurologia. Hospital Clínic de Barcelona. 3. Unitat de Toxicologia Clínica del Servei d' Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona

L'Amnèsia Global Transitòria (AGT) es caracteritza per una pèrdua transitòria de la memòria que apareix en majors de 50 anys, amb una freqüència similar entre ambdós sexes. Es desconeix l'etiologia i el diagnòstic és clínic.

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la relació entre el consum de tòxics i l'aparició d' AGT.

Entre l'1 de gener i el 31 de desembre 2018 es van identificar les AGT a urgències, ja fossin pures (AGT_{pur}), és a dir, sense altres manifestacions acompanyants, o en el context d'una intoxicació aguda (AGT_{tox}) o d' una agressió sexual (AGT_{sex}).

S'han inclòs 287 pacients amb AGT: 169 (58,9%) AGT_{sex}, 62 (21,6%) AGT_{pur} i 56 (19,5%) AGT_{tox}. El 76% (218 casos) eren dones. El rang d'edat va oscil·lar entre els 16 i 90 anys, sent 174 (60,6%) casos menors de 30 anys. Entre els antecedents patològics destacaven els psiquiàtrics amb 66 (23%) casos.

El consum de substàncies més reconegut va ser l'alcohol amb 201 (70%) casos, sent l'etanolemia positiva en 105 (49,6%) casos, amb una mitja d'alcohol en sang de 0,74 g/L i una concentració màxima de 4g/L.

Van reconèixer consum de cànnabis 20 (7%) pacients, trobant positivització en orina per una tècnica immuno-enzimàtica en 39 (13,6%) casos.

Quatre pacients van ser remesos en coma, utilitzant-se antídots (naloxona i/o flumazenilo) en tres d'ells (1%). Es va realitzar TAC cranial a 66 (23%) dels pacients.

No hi va a ver cap mort.

La freqüència d'AGT a urgències és elevada si s'inclouen els intoxicats i agressions sexuals. Predomina el sexe femení i els menors de 30 anys.

El tòxic associat amb major freqüència a l'AGT va ser l'alcohol, i tot i la presència de símptomes d'intoxicació, es van

utilitzar pocs antídots, sent més freqüent la sol·licitud d'una TAC cranial.

És necessari determinar la presència de tòxics en pacients amb AGT.