



LA PRIORITAT 0 I 1 , BASE DE L'ATENCIÓ AL PACIENT POLITRAUMATITZAT

RITA MARIA MACIEL, Rita Maciel; Sara Muñoz; Mireia Saura; Alba Marí;
Elena Jsutribó; Marianela Guzmán

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Introducció

L'atenció al pacient politraumatitzat ha variat en els últims anys. Des de l'aplicació del codi PPT s'ha millorat la comunicació entre els diferents nivells assistencials per oferir una atenció ràpida als pacients

Objectiu:

Descriure les característiques dels pacients que vénen al nostre servei amb una prioritat 0 i 1, la de major gravetat. Metodologia:
Estudi transversal retrospectiu dels 59 pacients que han estat atesos al nostre servei amb una prioritat 0 i 1, durant l'any 2016 i 2017.

Resultats

El tram d'edat amb major nombre de pacients ha estat entre els 16 i els 44 anys. Un 70% dels casos han estat homes. Més del 90% dels casos són traslladats per equips del SEM de transport primari. L'any 2017 va haver 18 casos amb prioritat 0 i 13 amb prioritat 1. L'any 2016, van ser 19 els casos amb prioritat 0 i 9 els casos amb prioritat 1. El 45% dels casos tenien un Glasgow de 15, però un 27 % tenia un Glasgow per sota de 9. Un 77% dels pacients van requerir intubació orotraqueal. Un 8,42 % dels pacients no portava collaret cervical tot i la gravetat del pacient. Un 13,5% dels pacients van morir com a conseqüència del politraumatisme.

Conclusions

El pacient politraumatitzat requereix una atenció ràpida i coordinada. Els pacients amb una prioritat 0 i 1 són els de major gravetat, i encara avui tenim prop d'un 10% dels pacients que no porten collaret cervical, quan aquest tipus de lesions són les de major gravetat.