



HAEMOPILUS I SEXE ORAL, UN NOU AGENT CAUSAL D'URETRITIS?

Jaume Borràs; Álvaro Vives; Carles Alonso-Tarrés; Carla Benjumea; Eduard Ruiz; Joan Palou.

Fundació Puigvert. Consulta d'Atenció Urgent

Introducció

Una de les infeccions de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre els homes és la uretritis. Les uretritis de transmissió sexual s'han classificat en gonocòcciques (GU) produïdes per *Neisseria gonorrhoeae* i no gonocòcciques (NGU) produïdes per altres gèrmens com: *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium* o *Ureaplasma urealyticum*. S'estima que en un 30-40% l'etiologia no queda aclarida. Recentment s'han descrit nous agents etiològics per les NGU amb especial rellevància del gènere *Haemophilus*, relacionat amb el sexe oral insertiu.

Objectiu

Descriure les característiques epidemiològiques, clíniques i de laboratori dels pacients diagnosticats de NGU per *Haemophilus* i comparar-les amb les dels diagnosticats de NGU pels altres gèrmens estudiats.

Metodologia

Estudi retrospectiu d'històries clíniques d'homes atesos a Urgències i a la consulta d'ITS del nostre centre entre gener-2018 i febrer-2019 amb cultiu convencional i PCR múltiple d'uretra a l'hora. Hem estudiat: dades demogràfiques, tipus de pràctiques desprotegides, motiu de consulta i durada de la clínica entre d'altres.

Estudi estadístic fet amb SPSS 18.0 Resultats

Vam incloure 158 casos amb edat mitjana de 31.6 anys. 86 van resultar positius per un dels gèrmens estudiats. *Haemophilus* fou el segon germen més freqüent (21) quan l'aïllament era únic: 16 *parainfluenzae* i 5 *influenzae*. Més del 95% dels casos reportaven sexe oral desprotegit. Entre els infectats per *Haemophilus* només el 19% explicava sexe vaginal desprotegit. El motiu de consulta més freqüent va ser la disúria, i la durada de la clínica de més d'una setmana, mostrant aquestes variables diferències estadísticament significatives respecte dels altres microorganismes estudiats.

Conclusions

- 1.- *Haemophilus* és un agent causal de NGU amb incidència creixent entre els practicants de sexe oral desprotegit
- 2.- Els motius de consulta dels infectats per *Haemophilus* són diferents als dels pacients infectats pels altres gèrmens
- 3.- La durada de la clínica és major en els infectats per *Haemophilus*