



MANEJO DE LAS ÚLCERAS ANALES EN URGENCIAS

Rosibel Martínez; Carmen Arto; Angela Domenech; María Royo; Sheila Ruiz; Joan Pellejà.

Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Servicio de Medicina Interna

INTRODUCCIÓ

A pesar de contar con medios para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), su incidencia está aumentando en España.

OBJECTIU

Evaluar el cribado, abordaje y seguimiento de los pacientes que acuden a urgencias con riesgo de ITS.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo retrospectivo en adultos en el período de tiempo desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 que consultan por aparición de úlcera anal de novo tras una conducta sexual de riesgo en el servicio de Urgencias.

RESULTATS

De los 7 casos, el 71,42% fueron hombres con edad media de 38,28. El 71,42% tuvieron sexo anal receptivo. Un 57,14% tenía antecedentes de ITS.

Se realizó cribado para infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a todos los pacientes. La serología de lúes se solicitó en un 71,42% y la PCR múltiple de ITS en un 85,7%.

Ninguno recibió tratamiento post exposición para VIH y uno de ellos no recibió tratamiento ni seguimiento. El resto de pacientes fueron tratados con ceftriaxona, doxiciclina y/o penicilina.

La media de pacientes derivados a consultas especializadas fue de 12,33 días. Un 85,71% seguido en ITS-Medicina Interna y un 14,29% en Proctología-Cirugía General. Las etiologías fueron sífilis (42,85%), Monkeypox (14,28%), infección por virus herpes (14,28%) y sin etiología un 28,57%.

CONCLUSIONS

Toda conducta sexual de riesgo debe cribarse con un estudio completo de ITS, atendiendo a la edad, sexo, prácticas sexuales de riesgo y manifestaciones clínicas del paciente.

Se desconoce si las parejas sexuales fueron cribadas y tratadas, datos de vital importancia para acortar la cadena de transmisión. El tratamiento y seguimiento recibido cumple los requisitos de las últimas guías. No puede evaluarse el adecuado manejo por falta de datos clínicos y exploratorios en los informes médicos.