



# XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari



## EFICÀCIA I SEGURETAT DE LA IVABRADINA EN INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA

Javier Jacob, Victoria Torres, Paola Beltran\*, Ferran Llopis, Carles Ferre, Ignasi Bardèss  
*Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. \*Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi*

**INTRODUCCIÓ:** La ivabradina està indicada en pacients amb insuficiència cardíaca en classe funcional NYHA IV, però no es coneix la tolerància d'aquest tractament en la fase aguda de la insuficiència cardíaca (ICA), per la qual cosa no es comença habitualment a urgències.

**OBJECTIU:** estudiar en una cohort de malalts amb ICA la eficàcia i seguretat de la ivabradina iniciada de manera precoç.

**METODOLOGIA:** estudi bicèntric de cohort observacional i prospectiu, no intervencionista, de pacients amb ICA on s'inicia tractament amb ivabradina de manera precoç. Es recullen dades demogràfiques, de l'episodi agut, de l'evolució i seguiment del tractament.

**RESULTATS:** es recullen 24 pacients amb ICA on s'inicia de manera precoç tractament amb ivabradina, l'edat mitja era de 70,4 anys, el 54,2% son homes i el 58,3% tenen la funció sistòlica deprimida, la resta conservada. La FC inicial i a l'alta van ser 96,3 i 70,3 batecs per minut, la pressió arterial sistòlica inicial i a l'alta van ser 146,2 i 121,2 mmHg, la pressió arterial diastòlica inicial i a l'alta van ser 82,2 i 66,8 mmHg. Aquestes diferències van ser significatives en tots els casos ( $p < 0,005$ ). No es va tenir que retirar cap tractament en cap cas per intolerància.

**CONCLUSIONS:** el tractament amb ivabradina en pacients amb ICA es segur, amb bona tolerància i eficàcia, per la qual cosa es podria iniciar en el moment agut.