



XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari



INTOXICACIONES EN EL ANCIANO

August Supervía Caparrós; Carlos Clemente Rodríguez; Isabel Puente Palacios; Francisco del Baño López; Oriol Pallàs Villaronga; José Luis Echarte Pazos
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar de Barcelona. Servicio de Urgencias

Objetivo: Conocer las características de las intoxicaciones en ancianos.

Métodos: Estudio descriptivo de las intoxicaciones atendidas en Urgencias durante 2009-2012 en mayores de 65 años G1:65-75 años y G2>75 años. Se recogió filiación, procedencia, tipo y lugar de la intoxicación, tóxico, existencia de interconsulta a psiquiatría y realización de comunicado judicial. Los datos se analizaron con SPSS 15. Resultados: Se atendieron 2673 intoxicaciones. 228 (8,5%) se produjeron en ancianos, G1:86(37,7%) y G2:142(62,3%). El 69,8% en G1 eran varones, mientras que el 76,1% en G2 eran mujeres ($p<0.001$). El 96,5% eran españoles y acudieron a través del SEM.

La intención de la intoxicación fue recreativa en 43 (50%) y en 12 casos (8,5%) en el primer y segundo grupo respectivamente. La causa accidental se registró en 28 casos (32,6%) y en 116 (82,3%) ($p<0.001$). El lugar de la intoxicación fue G1 domicilio en 54,7% y vía o lugar público en 40,7% de casos. En G2 los porcentajes fueron del 94,4% y del 3,5% ($p<0.001$).

Los tóxicos implicados fueron los fármacos [de predominio en el grupo G2 (80,3% vs 34,9%)] y el alcohol [más frecuente en el grupo G1 (55,8% vs 9,2%)]. Los fármacos más frecuentes fueron: digoxina (58 casos), benzodiazepinas (49) y opiáceos y antidepresivos (10 cada uno).

Se realizó consulta psiquiátrica en 23 (26,7%) y 13 casos (9,2%) respectivamente ($p=0.002$); se emitió el comunicado judicial solo en 11 (12,8%) y 13 casos (9,2%) ($p=ns$). Precisarón ingreso el 11,6% (10 casos) en el grupo de menor edad y 23,2% (33 pacientes) en el grupo de más de 75 años ($p=0.032$).

Conclusiones: Un porcentaje no despreciable de intoxicaciones se producen en el paciente anciano. En los de mayor edad predomina el sexo femenino, las intoxicaciones accidentales y son fundamentalmente por fármacos, siendo digoxina el más relevante. Se realiza comunicado judicial con escasa frecuencia.