



XXIIè Congrés Nacional Català d'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Urgències, tots a una!

Tarragona, 16 i 17 d'abril de 2015 Centre Tarraconense El Seminari



EXISTEIX VARIABILITAT INTERINDIVIDUAL EN L'ASSIGNACIÓ DEL NIVELL DE TRIATGE?

Elisenda Gómez-Angelats, Òscar Miró, Fuensant Fernàndez, Albert Antolín, Ernest Bragulat,
Miquel Sànchez

1-Àrea d'Urgències. Urgències Medicina. hospital Clínic Barcelona. 2-Urgències: "processos i
patologies" IDIBAPS.

Introducció

El Sistema Espanyol de Triage (SET-MAT) és el model validat de triatge estructurat més emprat a Catalunya. S'executa mitjançant el programa informàtic d'ajuda al triatge (PAT), eina que disminueix variabilitat a l'hora d'assignar prioritats. En el nostre centre el SET-MAT es va instaurar al 2009 i fins ara no s'hi ha estudiat la possible existència de variabilitat interindividual en la seva execució.

Objectiu

Estudiar si existeix variabilitat interindividual en l'assignació de nivell de triatge (NT) i els possibles factors associats

Metodologia

Estudi retrospectiu analític dels triatges realitzats d'abril del 2013 a abril del 2014 en un hospital de tercer nivell, on l'atenció es fa a diferents circuits assistencials. Valoració dels NT assignats pels professionals en funció dels torns en que treballen (matí, tarda i nit -TM, TT, TN-), sexe del triador, edat, experiència, i nivell a on treballen habitualment.

Resultats

82 professionals (70 dones i 12 homes) realitzaren 80847 triatges: 766 NI (0,9%), 8391 NII (10,3%), 46072 NIII (57,0%), 20933 NIV (26,0%) i 4685 NV (5,8%). No va haver diferències significatives en l'assignació del NT pel sexe del triador, edat ni experiència. El TN va mostrar un major percentatge de triatges NIII ($p < 0,001$) i un menor percentatge de triatges NIV ($p < 0,001$). El TM mostrà augment en el percentatge de triatges NV ($p < 0,05$). Objectivarem un augment significatiu de triatges de NIII en aquells que treballen en aquest nivell ($p < 0,001$). Finalment, l'assignació de NIV en el personal que treballa al NIV fou significativament major al de la resta ($p < 0,01$).

Conclusions

Aquest estudi demostra una existència de variabilitat interindividual en quant a l'assignació del NT en funció del torn d'infermeria que tria, i de la posició a on treballen habitualment els professionals. Això suggereix que el PAT podria ser una eina de valoració sotmesa a una certa subjectivitat.

triage, emergency, observer variation