



XXIII^è

Congrés nacional català d'urgències i emergències

PUNT D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

Seu: Tecnocampus
Mataró 14 i 15 d'abril 2016

CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

Germans Trias i Pujol
Hospital

SoCUMUE

TecnoCampus
Mataró-Maresme

ESTUDI COMPARATIU DE LES INTOXICACIONS EN PACIENTS DE MÉS I MENYS DE 65 ANYS.

August Supervía, María Dolores Aranda, Iván Gómez, Isabel Puente, María Pi-Figueras, Carlos Clemente.

Servei d'Urgències. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducció: Les intoxicacions son un motiu freqüent de consulta als serveis d'urgències. La majoria son en joves però cada cop es veuen mes intoxicacions en pacients ancians.

Objectiu: Determinar les diferències en les característiques de les intoxicacions entre malats de mes i menys de 65 anys.

Metodologia: Estudi retrospectiu de totes les intoxicacions ateses al servei d'Urgències del nostre centra durant els anys 2009-13. Es van recollir dades de filiació, intencionalitat, lloc i tipus de la intoxicació, forma d'arribada, destinació final i dades clíniques. Es van comparar les característiques de les intoxicacions entre malats de mes i menys de 65 anys.

Resultats: Es van recollir 2673 visites per intoxicacions agudes, de les que 2453 es van produir en pacients de menys de 65 anys i 220 en pacients d'edat igual o superior als 65 anys (8,2%). La edat mitjana del malats ancians fou de 78,9 (7,8) anys. Amb comparació amb els malats de menys de 65 anys, en el grup de pacients ancians hi havien mes dones (59,5% vs 36,3%; $p < 0,001$), menys percentatge de nascuts fora d'Espanya (2,7% vs 40%; $p < 0,001$) i son remesos més freqüentment en ambulància (88,2% vs 72,8%; $p < 0,001$). La majoria d'intoxicacions son accidentals (73,4% vs 23,7%; $p < 0,001$), majoritàriament per fàrmacs (63,9% vs 9%; $p < 0,001$), i solen produirse a domicili (80,5% vs 35,2%; $p < 0,001$). Els malats ancians precisen tractament actiu amb mes freqüència (72,7% vs 51,9%; $p < 0,001$) i hi ha més percentatge d'utilització de anexate (82,1% vs 47,5%; $p < 0,05$) i menys de naloxona (10,7% vs 44,3%; $p < 0,05$). Tanmateix, precisen ingrés hospitalari en més ocasions (19,8% vs 8,7%; $p < 0,001$).

Conclusions: Existeixen diferències importants en les característiques de les intoxicacions en pacients ancians respecta als malats joves. La majoria es produeixen a domicili, son sobre tot per fàrmacs i precisen tractament i ingrés amb mes freqüència.