



XXIII^è

Congrés nacional català
d'urgències i emergències

PUNT D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

Seu: Tecnocampus
Mataró 14 i 15 d'abril 2016

CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

Germans Trias i Pujol
Hospital

SoCUMUE

TecnoCampus
Mataró-Maresme

CARACTERÍSTIQUES CLÍNiques DE PRESENTACIÓ I IMPLICACIONS DE LA SOSPITA DE TUBERCULOSI EN EL SERVEI D'URGÈNCIES.

Ester Paula Fernández-Fernández; Eva Martínez-Suárez; Laura Pacho Millán; Goretti Saucá Subías; Josep Antón Capdevila Morell.
Consorti Sanitari del Maresme.

Introducció

La tuberculosi és una malaltia molt prevalent a la nostra àrea amb incidència entre 15-18 casos/105 habitants- any. Això representa un repte diagnòstic i tractament que sovint es realitza a urgències.

Objectius

Observar característiques sociodemogràfiques dels pacients TBC al 2015 al nostre hospital que ingressen a través d'urgències i valorar la idoneïtat dels aïllaments per sospita TBC.

Material i mètodes

Estudi descriptiu-retrospectiu pacients diagnosticats TBC durant 2015 que ingressen a través d'urgències. La recollida de dades s'ha fet amb la història clínica informatitzada, ordres d'aïllament i bacil·loscòpies d'esput.

Criteris d'inclusió: ésser diagnosticat TBC durant 2015 i ser ≥ 18 anys.

Resultats

S'han diagnosticat 34 casos. El 72.72% acut via Urgències ($n=24$), 18 homes i 6 dones. L'edat mitjana és 28.9 anys. Motiu consulta més freqüent tos (29%) i febre (25%).

Síntoma principal tos (75%), febre (46%) i dispnea (25%).

Durada clínica molt variable, de 3 fins a 365 dies.

Trobada radiològica més freqüent vessament pleural (31.43%), infiltrat (22.86%).

Se sol·liciten 74 BK en urgències 18 dels quals eren tuberculosos.

Es sospita tuberculosi en 15 pacients (62.5%).

El 54.16% dels pacients tuberculosos eren bacil·lífers. Dels bacil·lífers es va demanar BK en esput en 33.3% dels casos.

S'aïllen 11 pacients (45.83%), no s'aïllen 13 pacients.

Conclusions

Aprox $\frac{3}{4}$ (72.72%) pacients amb TBC són diagnosticats en àmbit hospitalari. Es sospiten a urgències el 62.5% i es demana BK en 75%

Motiu més freqüent consulta és tos i febre de llarga durada.

S'aïllen 45.84% i d'aquests, el 54.54% té indicació correcte; per altra banda el 53.84% dels pacients no aïllats haurien d'haver estat aïllats.