



XXIII^è

Congrés nacional català d'urgències i emergències

PUNT D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

Seu: Tecnocampus
Mataró 14 i 15 d'abril 2016



CONSORCI SANITARI
DEL MARESME



Germans Trias i Pujol
Hospital



TecnoCampus
Mataró-Maresme

CARACTERÍSTIQUES CLÍNiques DE LES INFECCIONS EN ELS MALalts NONAGENARIS A URGÈNCIES. HI HA DIFERÈNCIES AMB ELS ANCIANS MAJORS DE 75 ANYS?

Llopis Roca Ferran; Ferré Losa Carles; Jacob Rodríguez Javier; González del Castillo Juan;
Martínez Ortiz de Zárate Mikel; Bardés Robles Ignasi.
Hospital Universitari de Bellvitge.

Introducció Les infeccions representen pràcticament un 15% de les visites als serveis d'Urgències hospitalaris (SUH) i la seva incidència augmenta en la població anciana (>75 anys) i molt anciana (nonagenaris \geq 90 anys).

Objectiu Determinar les característiques clíniques dels malalts nonagenaris amb infecció atesos als SUH i comparar-les amb les infeccions dels pacients ancians majors de 75 anys.

Metodologia

Estudi descriptiu multicèntric amb anàlisi transversal en 49 SUH de l'estat espanyol de malalts nonagenaris amb infecció. S'analiza l'edat, gènere, comorbiditat, factors de risc per a patògens multirresistents, tipus d'infecció, criteris de sèpsia, microbiologia, tractament antibiòtic i destí. Es comparen els episodis dels pacients \geq 90 anys amb els ancians de 75 a 89 anys.

Resultats

Es registraren 407 malalts \geq 90 anys (edat mitjana $92,64 \pm 2,7$, rang 90-104), 45% amb patologia cardíaca, 25% diabetis, 23% institucionalitzats o amb manipulació prèvia, 19% MPOC, 17% amb insuficiència renal crònica i 16% amb consum previ d'antibiòtics. El 58% eren infeccions respiratòries, 31% urinàries i 7% de pell i parts toves. El 19% va presentar síndrome sèptica i els antibiòtics més prescrits foren betalactàmics (53%) i fluorquinolones (32%). El 54% van ingressar en una unitat d'hospitalització convencional i el 16% en una unitat d'observació o de curta estada, i hi hagué 7 (1,7%) exitus. Al comparar els episodis dels nonagenaris (407) amb els ancians de 75 a 89 anys (2.494), els primers eren més freqüentment dones (64% vs. 50%), tenien més factors de risc de patògens multirresistents (41% vs. 30%), més síndrome sèptica (19% vs. 14%) i requeriren més ingrés (54% vs. 38%) ($p < 0,05$).

Conclusions La població nonagenària amb infecció és cada cop més prevalent. Les unitats d'observació i de curta estada poden ser un bon recurs alternatiu a l'hospitalització convencional per aquest subgrup de malalts amb patologia infecciosa prevalent.