



XXIII^e

Congrés nacional català d'urgències i emergències

PUNT D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

Seu: Tecnocampus
Mataró 14 i 15 d'abril 2016

CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

Germans Trias i Pujol
Hospital

SoC MUE

TecnoCampus
Mataró-Maresme

INGESTA DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES A PEDIATRIA D'URGÈNCIES AMB IDEACIÓ AUTOLÍTICA.

Dina Cruz Artacho; Vanessa Moro Casasola; Maria Antonia Álvarez Cámara; Anna Lourdes Arocas Piquer; Ana Belén Hinojosa Gonzalez; Mercè Monleón Martínez.
Hospital del mar.

Introducció

Segons la OMS (2015) el suïcidi és un greu problema de salut pública, constituint la segona causa de mort entre els 15 i els 29 anys d'edat.

Objectiu

Conèixer la incidència de les intoxicacions amb ideació autolítica a pediatria a un hospital de tercer nivell.

Metodologia

Estudi retrospectiu descriptiu mitjançant revisió d'històries clíniques d'urgències pediàtriques des de Gener del 2013 fins Desembre del 2015.

Resultats

Les intoxicacions representen el 0,3% del total de les urgències pediàtriques del nostre centre. D'aquestes l'11,3% (N=12) van ser amb ideació autolítica i les substàncies més utilitzades van ser AINES i fàrmacs d'ús específic a Salut Mental (25% en cada cas). En quant al sexe, el 100% van ser dones, el 58,3% de les quals eren no autòctones amb un rang d'edat de 12 a 16 anys, sent els 15 anys l'edat de major incidència (33,3%). El motiu principal de la intoxicació amb ideació autolítica són sentiments negatius (58,4%), seguit de problemes familiars (25%). Respecte a l'entorn, el 91,7% viu en família. Un 75% de les adolescents presentaven antecedents psiquiàtrics, sent el més comú el trastorn depressiu (44%) i existint en un 58,3% intents previs d'autòlisis. El 91,7% van ser valorades per psiquiatria.

Conclusions

1. Existeix un percentatge no despreciable d'intoxicacions amb ideació autolítica entre les visites d'urgències pediàtriques al nostre centre.
2. Al nostre cas, en discordança amb la bibliografia existent, el 100% d'aquestes intoxicacions amb finalitat autolítica corresponen a dones.
3. La reincidència en l'intent autolític és un factor de risc que hauria d'alertar-nos d'un suport extern insuficient, pel que s'hauria de prestar major atenció a l'entorn familiar per valorar l'actitud del mateix davant la temptativa.