



# XXIII<sup>è</sup>

## Congrés nacional català d'urgències i emergències

PUNT D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

Seu: Tecnocampus  
Mataró 14 i 15 d'abril 2016

CONSORCI SANITARI  
DEL MARESME

Germans Trias i Pujol  
Hospital

SoCUMUE

TecnoCampus  
Mataró-Maresme

## ALTERACIONS CONDUCTUALS I HIDROCEFALIA AL SERVEI D'URGÈNCIES.

Oriol Yuguero; Violant Pujol, Xavier Ichart; Cecília Llobet, Ana Vena, Maria José Abadías.  
Servei d'Urgències. HUAV.

### INTRODUCCIÓ

La Hidrocefàlia és una malaltia poc freqüent i que genera símptomes que per la pressió assistencial, la manca de temps i el desconeixement d'aquesta entitat poden ser difícils de valorar en un servei d'urgències, i no sempre es presenten en població envellida.

### OBJECTIU

Descriure els principals símptomes i diagnòstic diferencial de les reaguditzacions dels pacients que presenten una hidrocefàlia en un servei d'urgències.

### METODOLOGIA

S'ha realitzat una anàlisi descriptiu dels 33 pacients que venen a un Servei d'Urgències d'un hospital de 2n nivell, durant l'any 2015, de les característiques clíniques, diagnòstic diferencials establerts i ruta assistencial realitzada.

### RESULTATS

Els pacients que pateixen Hidrocefàlia normotensiva i que vénen al servei d'urgències, no sempre presenten la tríada habitual, poden ser pacients joves i poden presentar només algun dels tres símptomes.

En el nostre cas, el més freqüent és l'alteració de la marxa en pacients geriàtrics i en els més joves es tracta dels canvis en estat d'ànim. Una manifestació clínica habitual en la població envellida que consulta als serveis d'urgències, però que en la població jove pot retrasar el diagnòstic.

### CONCLUSIONS

La hidrocefàlia normotensiva, tot i ser poc freqüent, és una entitat clínica que cal tenir en compte en els pacients que presenten alteració de la marxa o canvis d'estat mental recents. A vegades són catalogats com pacients psiquiàtrics i no s'ofereixen els tractaments adients provocant una límitació important per a la realització de les activitats de la vida diària. Cal conèixer la resta de símptomes i realitzar un diagnòstic acurat i ràpid per oferir el màxim benefici terapèutic al pacient.