



AVALUACIÓ DE LA SEDACIÓ AL PACIENT TERMINAL A URGÈNCIES

Azahara Moral German; Marc Ramón Borràs; Aroa Farré Moya; Lidia López Martin; M^a Jose Álvarez Diaz; Isabel Tirado Ortiz.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona. Servei d'Urgències. Institut Català de la Salut

Introducció: Els Serveis d'Urgències (SU) son unitats en les quals la percepció de salvar la vida està present des del primer moment. No obstant, l'envelliment i les comorbiditats de la nostra població ens posen davant de malalts complexos en els quals el tractament pot ser fútil.

Objectiu: Avaluar la instauració de mesures de confort en els pacients que presenten mal pronòstic, no responen al tractament i acaben sent èxits al SU.

Metodologia: Estudi retrospectiu, observacional descriptiu. Es van incloure pacients majors de 18 anys que van ser èxits al SU durant l'any 2021. Es van recollir variables demogràfiques, clíniques i de laboratori.

Resultats: Es van analitzar 88 pacients. La mitjana d'edat va ser de 82 anys RIQ (68-86). El 62% sexe masculí.

Els motius més freqüents de consulta van ser: dispnea, disminució del nivell de consciència i malestar general amb un 27,3%, 20,5% i 12,5% respectivament.

El 78,5% (n=69) presentaven constants d'entrada alterades i el 95,5% (n=84) presentaven valors analítics de mal pronòstic. Al 69,3% (n=61) se'ls hi van aplicar mesures de confort; al 30,7%(n=27) no.

Al 65,9% dels pacients (n=58) se'ls va aplicar tractament per millorar; d'aquests el 94,8% (n=55) no van presentar resposta analítica. A tots, se'ls va iniciar mesures de confort.

Dels pacients als quals se'ls hi van iniciar mesures de confort al 57,4% (n=35) se'ls hi van retirar les mesures invasives respecte un 39,3% (n=24) on aquestes es van mantindre (p= 0.05).

El 7,9% (n=9) van morir sense sedació al SU.

Conclusions: La majoria de pacients al SU moren sota sedació; tot i així resta un 7,9% que ho va fer sense. Tot i morir amb sedació a un 39% dels pacients se'ls hi va mantenir el tractament.