



URGÈNCIES
HISTÒRIA D'UNA
ESPECIALITAT

XXIX
CONGRÉS
NACIONAL
CATALÀ
D'URGÈNCIES I
EMERGÈNCIES

BARCELONA
RECINTE MODERNISTA
HOSPITAL SANTA CREU I
SANT PAU
18 - 19 ABRIL 2024



RELACIONS OBLIDADES, OPORTUNITATS PERDUDES

Eduard Poch Ferret; Irina Martín Besalú; Anna Felip Palaus; Ariadna Alarcón Calvet; Anna Gill Martínez; Ivette Abascal Cambras

Hospital Josep Trueta

INTRODUCCIÓ

La infecció pel Virus de la immunodeficiència humana (VIH) és un problema de salut pública, el 9% de la població afectada a Catalunya ho desconeix. Hi ha un conjunt de patologies associades al VIH on destaca la infecció pel Virus Herpes Zoster (VHZ), estimant-se una prevalença d'associació del 8-10%.

OBJECTIU

Analitzar si en els pacients valorats per VHZ als serveis d'urgències hospitalàries (SUH) s'ha sol·licitat la serologia de VIH, el seu resultat i les característiques del pacient.

METODOLOGIA

Estudi descriptiu, observacional i retrospectiu de pacients diagnosticats de VHZ als SUH durant 2022 i 2023. S'ha revisat si s'ha realitzat la serologia per VIH, el resultat i el seu estat serològic en els últims 5 anys, així com les seves característiques.

RESULTATS

Hem inclòs 248 casos diagnosticats VHZ a dos SUH. S'han exclòs menors, errors de diagnòstic i VIH coneguts, restant 212 pacients. L'edat mitjana és de 59,9 anys, 57% dones i 86% consultaven per afectació cutània. Al 15,5% se'ls havia sol·licitat la serologia VIH (per altres motius) en els últims 5 anys.

Als SUH es va realitzar serologia VIH a 12 pacients (5.6%), tots amb resultat negatiu. D'aquests, el 58,3% eren homes, amb una mitjana de 51,9 anys. Tots presentaven afectació cutània i 33,3% mostraven altres símptomes.

CONCLUSIONS

La infecció per VHZ és un motiu de consulta freqüent i l'associació amb VIH està descrita, no obstant, sospitavem que era un dels motius al què menys serologies VIH es sol·licitaven. Al nostre estudi, només al 5% de pacients amb VHZ s'ha realitzat serologies, ja sigui perquè el diagnòstic és clínic, el poc coneixement d'aquesta associació o a les pròpies limitacions d'aquest estudi.

En conclusió, les xifres de cribatge de VIH en pacients amb VHZ són millorables, resulta fonamental insistir en programes de conscienciació sobre aquesta associació i implantació de protocols.