



CODI AGITACIÓ HOSPITALARI: EXPERÈNCIA D'UN HOSPITAL DEL TERCER NIVELL

Marta Castellà Rovira; M^a Del Mar Carceller Sindreu; Jesús Ruiz Ramos; Fernando Santos Blas; Olga Martínez Piera; Paola H. Ponte Márquez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Urgències Generals

INTRODUCCIÓ

El codi agitació hospitalari permet atendre de forma precoç, ordenada i multidisciplinària. Es va implementar a Barcelona ciutat l'any 2019 i ha suposat una gran millora en la seguretat i temps de permanència a urgències.

OBJECTIU

Descriure les característiques dels pacients que ingressen a urgències com a codi agitació. Determinar la causa de l'agitació i el temps d'estada a urgències.

METODOLOGIA

Estudi observacional retrospectiu dels pacients (p) atesos a un hospital de tercer nivell entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024. S'utilitzen els estadístics descriptius pertinents i X² per a l'associació de variables si s'escau mitjançant SPSS V29.

RESULTATS

Els 246p atesos com a codi agitació durant l'any 2024 són majoritàriament homes (62%), amb una mitjana d'edat de 39 anys (DE 14,4) els homes i 41 anys (DE 15,8) les dones sense diferències estadísticament significatives. El 93% dels pacients havien estat traslladats pel SEM (15,8% USVA i 77,3% USVB). El 19% havien consultat els 30 dies previs al servei d'urgències. Les dones tenien més tendència a reconsultar que els homes ($p=0,05$). El principal motiu de consulta va ser el consum de substàncies (120p, 48,8%), entre les quals l'alcohol està present en un 51,6% dels casos (sol o en combinació amb altres tòxics). El 16% van requerir ingress al propi centre hospitalari i el 12,3% van ser traslladats a un altre centre. L'estada mitja al servei d'urgències va ser de 14h 12' i cap pacient va ser contingut en decúbit pro.

CONCLUSIONS

El pacient agitad sol ser un home de mitjana edat. L'abús de substàncies és el principal motiu d'agitació a la via pública. L'estandardització del maneig dels pacients agitats simplifica l'atenció, minimitza riscos, disminueix l'estada mitja i per tant millora la seguretat del pacient i del professional.

Paraules clau: Agitació Psicomotora; Urgències Mèdiques; Seguretat