



FACTORS ASSOCIATS A GRAVETAT EN INTOXICACIONS AGUDES EN PERSONES QUE VIUEN AMB EL VIH

Martin Ana(1), Perelló Rafael(1), Vallecillo Gaby(2), Supervia August(3,4,5), Anaya Sara(3), Martínez Montse(6)

1 Servei d'Urgències Hospital Clínic, 2 Unitat Adiccions, Hospital ParcSalut Mar, 3 Servei d'Urgències Hospital ParcSalut Mar, 4 Unitat Funcional de Toxicologia del Hospital del Mar, 5 SoCMUETox, 6 Institut

Introducció.

El consum de substàncies és un factor important en els trastorns de salut que poden patir les persones que viuen amb el VIH (PVVIH). El objectiu d'aquest estudi es determinar quins factors s'associen a intoxicació greu en PVVIH.

Material i Mètodes.

Estudi, prospectiu, observacional, en tres hospitals universitaris terciaris, tots especialitzats en l'atenció del VIH. El mostreig es va realitzar al febrer, maig i octubre de 2016, 2019 i 2022. Es van incloure pacients amb intoxicacions agudes no accidentals que van acudir als respectius Serveis d' Urgències. Les intoxicacions greus es van definir com aquelles que van requerir ingrés hospitalari. El diagnòstic de les substàncies implicades es va realitzar mitjançant anamnesis i tècniques d'immunoassaig.

Resultats

De les 2.378 intoxicacions, 179 (7,5%) van requerir ingrés i cinc (0,2%) foren exitus; 113 (4,7%) es van produir en PVVIH. En comparació amb les persones VIH negatives, les PVVIH eren més grans, predominantment masculines i més propenses a tenir trastorns psiquiàtrics, ús intravenós i consumir múltiples substàncies, com ara cocaïna, heroïna, benzodiazepines i amfetamines. En canvi, l'alcohol i el cànnabis eren més comuns en pacients VIH negatius. En l'anàlisi multivariant, la comorbiditat psiquiàtrica (OR 3,54, IC del 95%: 2,02-6,20), el consum de benzodiazepines (OR 1,75, 1,21-2,53), el consum de cànnabis (OR 1,65, 1,07-2,54) i l'edat ≥ 50 anys (OR 1,45, 1,01-2,09) es van associar amb intoxicacions greus, mentre que l'alcohol (OR 0,43, 0,31-0,61) i la nacionalitat estrangera (OR 0,53, 0,36-0,77) es van associar inversament.

Conclusions.

La patologia psiquiàtrica, el consum de benzodiazepines i de cànnabis i l'edat ≥ 50 anys son factors predictius d'intoxicació greu en PVVIH, mentres que el consum d'alcohol i la nacionalitat estrangera en mostra com factors protectors. Donat l'envelliment progressiu de la població amb VIH, s'hauria d'implementar un cribatge consum de substàncies, i de la comorbiditat psiquiàtrica en l'atenció rutinària