



DETECCIÓ DEL VIH A URGÈNCIES, QUAN L'EPIDEMIOLOGIA ÉS CLAU EN EL DIAGNÒSTIC

Neus Robert Boter, Raúl Martínez Izquierdo, Jordi Llaneras, Mireia Saura, Marco Antonio Bustamante, Ana Chivite

Urgències Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Introducció

El programa de detecció del VIH a Urgències (VIHgila) està àmpliament instaurat al nostre territori, demostrant la seva eficàcia des dels seus inicis. Al 2025 s'amplien 2 condicions clíniques (síndrome febril i plaquetopènia), un criteri epidemiològic com la procedència de país endèmic, així com determinació de VHC.

Objectiu

Descriure les característiques dels pacients a qui es sol·licita una serologia per procedència de país endèmic dins el programa VIHgila.

Metodologia

Estudi descriptiu retrospectiu de no intervenció de les serologies per VIH realitzades en els Serveis d'Urgències de 5 hospitals adscrits al VIHgila durant el 2025.

Resultats

S'han realitzat 4.387 serologies, d'aquestes el 6,9% dels casos per les noves recomanacions, amb 81 (1,8% del total) per país endèmic.

L'edat mitjana ha sigut de 39,7anys (DE±11,4), amb predomini d'homes del 77,7%. S'han detectat 3 serologies positives de VIH (3,7%), 2 de les quals en dones. S'ha realitzat la serologia de VHC en 42 casos (51,8%) sent totes negatives.

Al comparar aquest grup amb la resta de motius de serologia, destaca una edat inferior en aquells per país endèmic (39,7anys DE±11,4 vs 43,1anys DE±18; $p < 0,005$) amb predomini de dones amb serologia positiva sense significació estadística (66,6% vs 14,2%; $p = 0,08$). En tots els grups s'han realitzat serologies de VHC en percentatge similar (51,8% vs 56,6%; $p = 0,4$).

Dels 23 pacients a qui es va calcular el Fiebig (23/45) aquest era de 5-6 en 21 d'ells. Conclusions

Les serologies per país endèmic resulten eficaces (positivitat >0,1%).

En les dones procedents de països amb elevada prevalença de VIH, resulta especialment necessari realitzar serologies a urgències.

L'associació de la serologia de VIH i VHC, encara representa un gran punt de millora, però la seva baixa taxa de positivitat potser ens ha de fer replantejar la seva idoneïtat.

El diagnòstic de VIH es segueix realitzant en fases tardanes de la malaltia