



RESULTATS PRELIMINARS DEL PROJECTE HEPASEM: PRIMER CRIBRATGE EXTRAHOSPITALARI DE L'HEPATITIS VÍRICA EN EL SEU GÈNERE

Daniel Martínez Vázquez, Mar Riveiro Barciela, Clara Canela Pujol, Francesc Carmona, Maria Buti, Maria Angeles Soto Garcia

Servei d'Emergències Mèdiques

Introducció

Una proporció substancial de persones que viuen amb hepatitis vírica roman sense diagnosticar, especialment entre poblacions amb accés limitat a l'atenció sanitària. Els programes de cribatge als serveis d'urgències hospitalàries han mostrat una prevalença superior a l'esperada. Fins ara, no hi ha dades sobre el cribatge extrahospitalari a nivell comunitari en situacions urgents.

Objectius

El nostre objectiu va ser implementar i avaluar prospectivament un programa de cribatge oportunista per a l'hepatitis B, C i D en l'àmbit d'emergències.

Metodologia

HEPASEM és un programa prospectiu, multicèntric i oportunista de cribatge d'hepatitis vírica.

La fase pilot es va dur a terme en 20 unitats avançades a la ciutat de Barcelona. Eren elegibles els subjectes ≥ 16 anys, vius i identificats.

L'estrategia de diagnostic es va fer mitjançant puncions capil·lars per a HBsAg i anti-VHC. En cas de resultats positius, es van recollir mostres en targetes de separació de plasma per a la determinació diferida de càrrega viral.

Tots els subjectes HBsAg+ o amb VHC-RNA detectable van ser derivats per posterior seguiment i tractament.

Resultats

Entre el 15/10 i el 15/12 de 2025, es van cribar 227 subjectes d'un total de 4299.

Es va detectar anti-VHC en 1,8% i HBsAg en 1,3%. Tots els subjectes anti-VHC+ presentaven VHC-RNA indetectable, i tots els individus HBsAg+ van resultar negatius per anti-VHD i es van classificar com a infecció crònica per VHB HBeAg-negativa.

La taxa de cribatge va ser superior entre els pacients que requerien accés venós (7,3% vs 3,6%, $p < 0,001$) o presentaven antecedents de consum de drogues (7,8% vs 5,2%, $p = 0,098$), però similar segons el gènere, el tipus d'unitat extrahospitalària o l'activació d'un codi prioritari.

Conclusions

HEPASEM representa el primer cribatge oportunista extrahospitalari d'hepatitis vírica descrit.



Aquest estudi constitueix un enfocament innovador en salut pública que pot contribuir a l'eliminació de l'hepatitis vírica.